

SURVEY AIPO

"IPF"

RISULTATI

143 VOTANTI

1. Quanti nuovi casi all'anno di IPF hanno accesso alla sua struttura?

- a. <3 => 28,67% (41 voti)
- b. <5 => 28,67% (41 voti)
- c. <10 => 21,68% (31 voti)
- d. <20 => 10,49% (15 voti)
- e. >20 => 5,59% (8 voti)
- f. Non risposto => 4,9% (7 voti)

2. Quale è l'età media dei pazienti con IPF che vengono seguiti nella sua struttura?

- a. 50-55 => 15,38% (22 voti)
- b. 55-60 => 32,87% (47 voti)
- c. 60-65 => 33,57% (48 voti)
- d. 65-70 => 12,59% (18 voti)
- e. Non risposto => 5,59% (8 voti)

3. Quale è il rapporto maschio/ femmina nei pazienti con IPF seguiti nella sua struttura?

- a. 1:1 => 12,59% (18 voti)
- b. 2:1 => 43,36% (62 voti)
- c. 3:1 => 25,87% (37 voti)
- d. 1:2 => 11,19% (16 voti)
- e. Non risposto => 6,99% (10 voti)

4. C'è un ambulatorio dedicato ai pazienti con IPF nella sua struttura?

- a. Sì \Rightarrow 23,08% (33 voti)
- b. No \Rightarrow 71,13% (106 voti)
- c. Non risposto \Rightarrow 2,8% (4 voti)

5. Quali indagini vengono eseguite alla diagnosi di IPF?

- | | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| a. HRCT | => | 63,64% (91 voti) |
| b. Curva flusso volume e DLCO | => | 9,09% (13 voti) |
| c. BAL | => | 4,2% (6 voti) |
| d. TBB | => | 2,8% (4 voti) |
| e. Walking test | => | 2,8% (4 voti) |
| f. Ecocardiografia | => | 8,39% (12 voti) |
| g. Non risposto | => | 9,09% (13 voti) |

6. Quale è la percentuale di pazienti che hanno la diagnosi di IPF in base alla biopsia chirurgica?

- | | | |
|-----------------|----|------------------|
| a. 10% | => | 47,55% (68 voti) |
| b. 15% | => | 13,29% (19 voti) |
| c. 20% | => | 17,48% (25 voti) |
| d. 25% | => | 4,9% (7 voti) |
| e. 30% | => | 9,79% (7 voti) |
| f. Non risposto | => | 6,99% (10 voti) |

7. Esiste un approccio multidisciplinare alla diagnosi di IPF nel suo centro?

- | | |
|--|----------------------|
| a. Pneumologi, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici | = > 35,66% (51 voti) |
| b. Pneumologi, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici,
Reumatologi | = > 6,99% (10 voti) |
| c. Pneumologi, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici,
Reumatologi, Cardiologi | = > 7,69% (11 voti) |
| d. Non esiste un approccio multidisciplinare | = > 46,15% (66 voti) |
| e. Non risposto | = > 3,5% (5 voti) |

8. Esiste un percorso di cure palliative per pazienti con IPF nella sua struttura?

- a. Sì \Rightarrow 25,17% (36 voti)
- b. No \Rightarrow 71,33% (102 voti)
- c. Non risposto \Rightarrow 3,5% (5 voti)

9. Quanti malati/ anno con IPF seguiti nella sua struttura sono sottoposti a trapianto polmonare?

- | | | |
|-----------------|----|------------------|
| a. Nessuno | => | 65,73% (94 voti) |
| b. 1-3 | => | 25,17% (36 voti) |
| c. 3-5 | => | 1,4% (2 voti) |
| d. 5-8 | => | 0,7% (16 voti) |
| e. Non risposto | => | 6,99% (10 voti) |

10. In caso di esacerbazione acuta di IPF il paziente viene ventilato meccanicamente?

- | | | |
|--------------------|----|------------------|
| a. Sempre | => | 6,29% (9 voti) |
| b. Mai | => | 2,8% (4 voti) |
| c. Molto raramente | => | 51,05% (73 voti) |
| d. Spesso | => | 35,66% (51 voti) |
| e. Non risposto | => | 4,2% (6 voti) |

11. Esiste un data base per pazienti con IPF nella sua struttura?

- a. Sì \Rightarrow 24,48% (35 voti)
- b. No \Rightarrow 71,33% (102 voti)
- c. Non risposto \Rightarrow 4,2% (6 voti)